



<p>ARVICOLA TERRESTRIS</p>	<p><b><i>Campagnol terrestre ou taupe grise</i></b></p>
	<p>Dos brun-gris et ventre gris (albinos très rares), longueur du corps 12-18 cm</p> <p>Adulte: 65-120 grammes</p>
	<p>Museau obtus, moustaches, 4 incisives à croissance continue pour ronger.</p> <p>Yeux noirs</p> <p>Oreilles courtes qui ne dépassent pas le pelage.</p>
<p><b><i>Reproduction et durée de vie</i></b></p> 	<p>De mars à octobre, toutes les 3 à 5 semaines, 4 à 5 petits (après 21 jours de gestation) aptes à se reproduire dès 6 semaines, durée de vie moyenne 3 à 7 mois.</p> <p>Pullulation tous les 5 à 6 ans dans les herbages de montagne.</p> <p>Mortalité hivernale toujours très importante, même lors des pullulation.</p>
<p><b><i>Alimentation</i></b></p>	<p>Racines (charnues de préférence) et de parties vertes des plantes (un campagnol de 90 g a besoin de 10 à 15 grammes de matière sèche/jour)</p>
<p><b><i>Comportement</i></b></p> <p>Vit en groupes familiaux, réaménage sans cesse ses réseaux de galeries souterraines. Creuse avec ses incisives, tasse la terre dans les galeries devenues inutiles ou évacue la terre par des taupinières. Il parcourt régulièrement ses galeries et répare aussitôt les parties endommagées, par exemple lors du piégeage ou par le piétinement du bétail.</p> <p>Se déplace en surface de préférence la nuit, par temps pluvieux, sinon lorsque la couverture herbeuse le permet ou sous la neige.</p> <p><b>Occupe les galeries de la taupe qui en est chassée.</b></p> <p><b>Très facile à capturer.</b></p>	

<b>Taupinières, boudins de terre et galeries</b>	
<p>Premières taupinières: n'importe où dans la parcelle</p> <p><b>Par groupes</b> Les taupinières apparaissent facilement quelques jours après une pluie estivale et sont les plus nombreuses à l'automne.</p>	
<p>Taupinières souvent accolées</p>	
<p>Boudins de terre après fonte des neiges</p>	
<p>Galerie principale et taupinières</p> <p>Galerie principale située latéralement à la taupinière, 40 à 80 mètres de galeries pour un foyer.</p> <p>Galeries de section ovale, plutôt verticale. </p>	
<p>Forme des taupinières: aplaties, souvent de terre fine mélangée avec des débris végétaux. Galerie d'évacuation <b>oblique</b>, au bord de la taupinière, latérale à l'axe de la galerie souterraine.</p>  <p><b>Campagnol terrestre</b></p>	
<p><b>Orifices</b> Durant une période de sécheresse ou lorsque le sol reste sec, les campagnols terrestres ne forment pas de taupinières mais laissent des orifices, avec de l'herbe coupée court autour, qui signalent la présence des foyers. Les coulées dans le gazon sont absentes, sauf sur quelques cm près de l'orifice.</p>	

*DEGATS*

Pas de pullulations dans les terres labourées régulièrement.



Pertes de fourrage, souvent prononcée sur la première coupe lors d'une pullulation.

Croissance de mauvaises herbes ou de plantes de faible valeur fourragère dans les lacunes (rumex, pâturin commun), mauvaise composition botanique.

Boudins de terre à la fonte des neiges et nombreuses taupinières pendant la saison qui gênent la fauche et dont la terre souille le fourrage.

