

Pharmacie d'école

Selon les recommandations de la Commission cantonale de médecine scolaire du 16 mars 2012

Matériel

Bandes de gaze
Bandes élastiques
Compresse
Sparadraps

Isopor (scotch)
Ciseaux
Brucelles
Gants

Bretelle
Set dentaire
Thermomètre



Médicaments

Tous les médicaments peuvent être source d'allergie ou d'effets secondaires indésirables. La remise de médicaments est donc toujours subordonnée à l'accord préalable des parents. La remise de tout autre médicament que ceux mentionnés dans les pharmacies est déconseillée (y compris remèdes homéopathiques), hormis en cas d'instructions explicites des parents.

Désinfectant:

Désinfection externe

Dafalgan:

État fébrile, état grippal, douleurs diverses (angines, otites, règles douloureuses)



6-12 ans: 250 mg sachets de poudre, max. 3 x 1 sachet par jour
> 12 ans: 500 mg comprimé, max. 3x 1cp/jour

Conseils

Les recommandations ci-dessous ainsi que l'utilisation éventuelle des médicaments de la pharmacie scolaire sont les premières mesures applicables dans le cadre de l'école. L'élève peu bien devrait ensuite rentrer à la maison, où il revient aux parents de prendre la relève.

Maux de gorge:

Gargariser avec une solution salée (une cuillère à café dans 1l d'eau)

Brulures:

En cas de brulures légères, rincer abondamment avec de l'eau froide; couvrir avec une compresse ou un linge propre; appliquer du froid

Douleurs abdominales:

Si l'origine est peu claire, il convient de consulter un médecin. Éviter de donner un médicament (risque de masquer une appendicite).

Maux de tête:

Boire beaucoup et éventuellement donner un Dafalgan, en attendant que l'élève rentre à la maison. Si les maux de tête ne résultent pas d'un état grippal manifeste, il faut être très prudent à l'évolution de l'état de l'enfant.



032 713 38 48 Urgences pédiatriques HNe

144 Ambulance

117 Police

**145 Centre d'information de toxicologie
(ou 044 251 51 51, info@toxi.ch)**