

PRÉVENTION & CONTRÔLE DE L'INFECTION

ESBL (non E. coli) portage

Agent infectieux

- Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi
- Bactérie résistante aux antibiotiques de la classe des bêtalactamines
- Elle peut causer des infections du sang, de l'urine, de la peau, des pneumonies et des infections abdominales.
- Elle se situe dans le tube digestif et se propage par les selles.

Mode de transmission

- Par contact direct avec le résident et ses liquides biologiques/selles
- Par contact indirect, via les mains contaminées des soignants, l'environnement contaminé ou le matériel de soins contaminé

Durée du portage

- Plusieurs mois à plusieurs années

*Mesures additionnelles
(MA) à mettre en place*

- **Aucune.** Les Précautions Standard suffisent en l'absence d'infection à ESBL



*Traitement de
décolonisation*

- Non-recommandé

PRISE EN CHARGE DU RESIDENT EN PRECAUTIONS STANDARD

*Équipement de
protection individuel pour
le personnel*

- **Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique 70% ou plus**
- Gants seulement si risque d'exposition aux liquides biologiques/selles, ou lors de l'utilisation d'un produit détergent-désinfectant
- Sur-blouse seulement si risque d'exposition aux liquides biologiques/selles

Matériel de soins

- Précautions Standard

Linge et vêtements

- Filière habituelle, selon Précautions Standard
- Sacs usuels, double emballage si souillé avec des liquides biologiques

Vaisselle

- Filière habituelle, selon Précautions Standard

Déchets

- Filière habituelle (déchets urbains), selon Précautions Standard

Sanitaires

- Sanitaires dédiés pour le résident porteur seulement s'il présente des diarrhées. Si ses selles sont formées → WC communs.

Circulation

- Le résident peut circuler librement hors de la chambre et prendre part aux repas collectifs et animations de groupe, SAUF s'il présente des diarrhées. Dans ce cas, maintien en chambre jusqu'au retour des selles normales.
- Si le site colonisé est une plaie, couvrir d'un pansement lors des sorties.
- Si le résident est incontinent fécal, il doit porter une protection propre pour circuler dans l'EMS

Voisin de chambre

- Le résident porteur d'ESBL peut être en chambre double sans aucune mesure particulière

Visiteurs

- Les visiteurs doivent se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de la chambre.

NETTOYAGE/DESINFECTION

Environnement

- Nettoyage-désinfection quotidien de la chambre avec le produit détergent-désinfectant habituel, selon le plan de désinfection
- Utiliser un simple détergent ou savon noir pour le sol

Linge et vêtements

- Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C (selon PS)
- Nettoyage des vêtements du résident à minimum 40°C (selon PS)

Matériel de soins

- Précautions Standard

DECLARATION OBLIGATOIRE

Médecin cantonal

- Non, sauf si flambée de cas (≥ 2 cas liés entre eux)

Infirmière PCI

- Non, sauf si flambée de cas (≥ 2 cas liés entre eux)