

DCI : LABÉTALOL**FORME GALÉNIQUE**

IV : Ampoule : 100 mg / 20 ml (5mg/ml)

ACTE MÉDICAL DÉLÉGUÉ CONCERNÉ

- Déficit neurologique focal (pas de délégation ambulancière)

INDICATION

Hypertension artérielle sévère : TAS \geq 220mmHg (But TAS \leq 180mmHg)

POSOLOGIE ET PREPARATION

- IV : Pur 5mg/ml en IV lent (minimum 1 minute) à répéter selon OM
- Dosage : 50 mg/min, à répéter toutes les 5 minutes jusqu'à la dose max de 200mg

Voies d'administration sur VVC ou VVP

Pousse seringue :

Préparation : Pur, soit 5mg/ml en mettant 2 ampoules de 20 ml dans une seringue de 50ml

Débit : 5mg/h soit 1ml/h puis augmenter selon les besoins (Max 200mg/h)

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue au labétalol

BAV II et III. Etat de choc. Hypotension marquée et persistante ou d'une bradycardie sévère. Antécédents d'asthme ou de broncho-pneumopathie obstructive

INCOMPATIBILITE : LASIX

EFFETS

Le Trandate est un antihypertenseur α et β bloquants. Il permet donc une vasodilatation et une diminution de la fréquence cardiaque. Effets maximum atteint dans les 5 minutes. Durée d'action 6 heures. Compatible avec la Cordarone.

EFFETS INDÉSIRABLES OU SECONDAIRES

Réactions d'hypersensibilité. Vision floue, bradycardie, bloc de conduction cardiaque, hypotension orthostatique, insuffisance cardiaque congestive, bronchospasmes, nausées, vomissements, douleurs épigastriques.

SURDOSAGE

Prudence dès que la dose de 300mg/24h est atteinte.

Le surdosage peut entraîner une hypotension prolongée et/ou une bradycardie marquées. Antagoniste : atropine par voie intraveineuse. En cas de bronchospasme chez le BPCO et asthmatique faire inhaler un stimulant β 2-adrénergique tel que le salbutamol.

RÉFÉRENCES

- Fiche pharmacologique CORFA 2015
- Compendium suisse des médicaments
- Fiche pharmacologique HNE

Toutes reproductions interdites