


STATISTIQUES DES MORSURES DE CHIENS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL (2002-2006)

Tableaux et graphiques


Evolution du nombre de morsures annoncées



Prévalence par district

| | Nbre de morsures par 100'000 habitants | Nbre de chiens par 100'000 habitants |
|-------------------|---|---|
| Neuchâtel | 48 | 4'170 |
| Boudry | 51 | 6'895 |
| Val-de-Travers | 98 | 10'911 |
| Val-de-Ruz | 48 | 9'025 |
| Le Locle | 51 | 8'502 |
| La Chaux-de-Fonds | 40 | 6'299 |

Age des victimes




Sexe des victimes

49% de victimes féminines




51% de victimes masculines


Gravité des morsures




Evolution de la gravité des morsures




Morsure simple ou multiple




Localisation des morsures




Relation entre la victime et le chien




Répartition annuelle des morsures




Lieu des morsures




Circonstances des morsures




Circonstances des morsures dans le groupe chiens de garde et de combat




Age des chiens mordeurs par rapport à la population canine



Sexe des chiens mordeurs



Poids des chiens mordeurs



Types de races les plus fréquents dans le canton de Neuchâtel

| Type de race | Nombre de chiens moyenne 2002 - 2006 | Pourcentage moyenne 2002 - 2006 |
|---------------------------------|---|------------------------------------|
| Labrador et Golden Retriever | 1629 | 13.6% |
| Bouvier bernois et appenzellois | 1189 | 10.0% |
| Yorkshire terrier | 1166 | 9,8% |
| Bergers allemand et belge | 975 | 8,2% |
| Jack Russel | 405 | 3.3% |
| Caniche | 363 | 3.0% |
| Border Collie | 333 | 2.8% |
| Cocker Spaniel | 288 | 2.4% |
| Coton Tuléar | 280 | 2.3% |
| Husky | 185 | 1.6% |


Types de races les plus mordeurs dans le canton de Neuchâtel

| Type de race | Pourcentage moyenne 2002 - 2006 |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Bergers allemand et belge | 17,3% |
| Bouvier bernois et appenzellois | 13,7% |
| Labrador et Golden Retriever | 9,4% |
| Rottweiler | 5,5% |
| Border Collie | 3,5% |
| Beauceron | 2,9% |
| American Staffordshire Terrier | 2,4% |
| Jack Russell | 2,4% |
| Autres terriers | 2,4% |
| Saint-Bernard | 1,8% |

Relation types de races – nombre de morsures

| Sélection d'origine | Morsures 2002-2006 % | Popul. canine % | Exemples de type de race | Population canine % | Morsures 2002 - 2006 % | Indice de dangerosité du groupe |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|
| Chiens de chasse | 30,0 | 48,3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Epagneul, Setter irlandais, Beagle, Bruno du Jura, Basset, Teckel, Fox Terrier, Pinscher, Griffon, Irish Wolfhund, Dogue allemand, Akita Inu, etc. | 16,2 | 12,7 | 0,6 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yorkshire | 9,8 | 1,6 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Labrador Retriever | 8,7 | 5,6 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Golden Retriever | 4,9 | 3,8 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jack Russel | 3,4 | 2,1 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Caniche | 3,0 | 2,1 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cocker | 2,3 | 2,1 | |
| Chiens de berger | 29,0 | 16,8 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beauceron, Berger des Pyrénées, Briard, Berger du Portugal, Komondor, Hovawart, Terrier tibétain, Bergamasque, Bobtail, Sheltie, Collie, etc. | 5,8 | 8,2 | 1,7 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berger allemand | 5,7 | 11,4 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berger belge | 2,5 | 5,9 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Border-Collie | 2,8 | 3,5 | |
| Bouvier | 19,2 | 11,3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouvier bernois | 5,6 | 7,3 | 1,7 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouvier appenzellois | 4,4 | 6,4 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rottweiler (Bouvier allemand) | 0,8 | 5,5 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bouvier Entlebuch, Bouvier suisse, etc. | 0,5 | 0 | |
| Chiens de compagnie | 4,7 | 9,9 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coton Tuléar, Pékinois, Cavalier King -Charles, Shi Tzu, Bichon, Lhasa apso, Epagneul tibétain etc. | 9,9 | 4,7 | 0,5 |
| Chiens de garde et de combat | 9,4 | 3,5 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bull-terrier, Cane corso, Mâtin de Naples, Shar-Pei, Chow-Chow, Dobermann, Boxer, Bulldog, etc | 2,2 | 6,4 | 2,7 |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pitbull | 0,4 | 1,4 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Américain Staffordshire Terrier | 0,9 | 1,6 | |
| | | | | | | |
| Chiens de trait et de traîneau | 2,7 | 2,3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alaskan malamuth, Husky de sibérie, Samoyède, Eurasien, Dalmatien, etc. | 2,3 | 2,7 | 1,2 |
| Chiens de sauvetage | 3,6 | 1,6 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ St-Bernard, Léonberg, Terre-Neuve | 1,6 | 3,6 | 2,2 |
| Chiens de course | 0 | 0,3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barzoï, Whippet | 0,3 | 0 | 0 |
| Aucun type de race | 1,4 | 6,0 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bâtard | 6,0 | 1,4 | 0,2 |

Récidive de morsures



Evolution des récidives de morsures

