

PRÉVENTION & CONTRÔLE DE L'INFECTION

Gastro-entérite (Norovirus/Rotavirus)

<i>Mode de transmission</i>	<ul style="list-style-type: none"> Par contact direct avec le résident et ses liquides biologiques Par contact indirect lorsqu'on touche l'environnement contaminé du résident avec les mains ensuite portées au visage Par gouttelettes à < 2 mètres, si projections lors des vomissements
<i>Période d'incubation</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 3 jours
<i>Période de contagiosité</i>	<ul style="list-style-type: none"> Du début des symptômes jusqu'à 48 heures après la fin de ceux-ci
<i>Mesures additionnelles (MA) à mettre en place</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Contact</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Gouttelettes (si vomissements)</p>  </div> </div>
<i>Durée des MA</i>	<ul style="list-style-type: none"> Lever les MA 48 heures après la fin des symptômes

PRISE EN CHARGE DU RESIDENT SOUS MESURES ADDITIONNELLES

<i>Équipement de protection individuel pour le personnel</i>	<ul style="list-style-type: none"> Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique 70% ou plus Sur-blouse pour tout contact avec le résident ou son environnement Gants <u>seulement si risque d'exposition aux liquides biologiques ou lors de l'utilisation d'un produit détergent-désinfectant</u> Masque chirurgical <u>seulement si vomissement et contact à < 2 mètres</u> Lunettes de protection si vomissements et contact à < 2 mètres 								
<i>Affiches signalétiques</i>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p><u>Sur la porte de la chambre :</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Extérieur</td> <td style="text-align: center;">Intérieur</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p><u>Si vomissements :</u></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Intérieur</td> <td style="text-align: center;">Extérieur</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table> </div> </div>	Extérieur	Intérieur			Intérieur	Extérieur		
Extérieur	Intérieur								
									
Intérieur	Extérieur								
									
<i>Matériel de soins</i>	<ul style="list-style-type: none"> Privilégier le matériel à usage unique Si possible, dédier le matériel de soins à usage multiple au patient pendant la durée de l'isolement 								
<i>Linge et vêtements</i>	<ul style="list-style-type: none"> Filière habituelle, selon Précautions Standard Sacs usuels, double emballage si souillé avec des liquides biologiques 								

<i>Vaisselle</i>	<ul style="list-style-type: none"> Filière habituelle, selon Précautions Standard (pas de vaisselle jetable)
<i>Déchets</i>	<ul style="list-style-type: none"> Filière habituelle (déchets urbains), selon Précautions Standard
<i>Sanitaires</i>	<ul style="list-style-type: none"> Si pas de WC privé dans la chambre, installer une chaise percée dédiée au chevet.
<i>Circulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> Le résident doit rester en chambre jusqu'à la fin de son isolement
<i>Voisin de chambre</i>	<ul style="list-style-type: none"> Si possible, déplacer le voisin dans une autre chambre dès le début des symptômes du résident contaminé. Ne pas déplacer le résident contaminé. Si le voisin ne peut pas être déplacé, isolement géographique en chambre avec distance >2 mètres entre les deux. Les deux résidents doivent avoir des WC séparés. Dans les deux cas, le voisin doit être mis en quarantaine pour 72 heures à partir du dernier contact avec le résident contaminé.
<i>Visiteurs</i>	<ul style="list-style-type: none"> Les visiteurs doivent revêtir le même équipement de protection que le personnel et se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de la chambre Chaque visiteur doit être informé des mesures à respecter par un collaborateur soignant avant la 1^{ère} visite Ne pas utiliser les WC de la chambre

NETTOYAGE/DESINFECTION

<i>Environnement</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage-désinfection des surfaces/objets fréquemment touchés par le résident (table de chevet, poignées de porte, accoudoir, télécommande ...) et des WC minimum <u>2 x/jour avec de la Javel à 0.5% ou un produit à base de peroxyde d'hydrogène 0.5%</u> Nettoyer-désinfecter les souillures visibles immédiatement Utiliser un simple détergent ou savon noir pour le sol Nettoyage-désinfection <u>terminal</u> (toutes les surfaces, changement de draps, linge de bain, rideau) de la chambre et des WC à la levée de l'isolement
<i>Linge et vêtements</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C (selon PS) Nettoyage des vêtements du résident à minimum 40°C + ajout d'un savon désinfectant Changer la literie et le linge de bain à la levée de l'isolement
<i>Matériel de soins</i>	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage-désinfection du matériel de soins avec <u>de la Javel à 0.5% ou un produit à base de peroxyde d'hydrogène</u> avant de le sortir de la chambre si celui-ci le supporte, sinon utiliser un produit à l'alcool 70%.

DECLARATION OBLIGATOIRE

Médecin cantonal	<ul style="list-style-type: none"> Non, seulement si flambée de cas (≥ 2 cas liés entre eux)
Infirmière PCI	<ul style="list-style-type: none"> Oui, merci d'informer l'infirmière PCI via scsp.pci@ne.ch