

PRÉVENTION & CONTRÔLE DE L'INFECTION

Influenza (grippe)

<i>Mode de transmission</i>	<ul style="list-style-type: none"> Par gouttelettes lors d'éternuements ou de postillons à < 2 mètres Par contact indirect lorsqu'on touche l'environnement contaminé par les gouttelettes avec les mains ensuite portées au visage
<i>Période d'incubation</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1 à 4 jours (en moyenne 2 jours)
<i>Période de contagiosité</i>	<ul style="list-style-type: none"> Débute 24 heures avant l'apparition des symptômes jusqu'à 5 jours après. Cette période peut être prolongée chez les immunocompromis
<i>Mesures additionnelles (MA) à mettre en place</i>	<p>Gouttelettes</p> 
<i>Durée des MA</i>	<ul style="list-style-type: none"> Levée des MA minimum 5 jours après l'apparition des symptômes, si l'évolution de ceux-ci est favorable
<i>Vaccination</i>	<ul style="list-style-type: none"> Vaccination recommandée pour les résidents et collaborateurs en novembre

PRISE EN CHARGE DU RESIDENT SOUS MESURES ADDITIONNELLES

<i>Équipement de protection individuel pour le personnel</i>	<ul style="list-style-type: none"> Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique 70% ou plus Sur-blouse si contact à moins de deux mètres du résident ou risque d'exposition à des liquides biologiques Gants <u>seulement si risque d'exposition aux liquides biologiques ou lors de l'utilisation d'un produit détergent-désinfectant</u> Masque chirurgical lors de contact à moins de 2 mètres Lunettes de protection si contact à moins de deux mètres et que le résident tousse 				
<i>Affiches signalétiques</i>	<p><u>Sur la porte de la chambre :</u></p> <table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">Extérieur</td> <td style="text-align: center;">Intérieur</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	Extérieur	Intérieur		
Extérieur	Intérieur				
					

<i>Matériel de soins</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Privilégier le matériel à usage unique • Si possible, dédier le matériel de soins à usage multiple au patient pendant la durée de l'isolement
<i>Linge et vêtements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Filière habituelle, selon Précautions Standard • Sacs usuels, double emballage si souillé avec des liquides biologiques
<i>Vaisselle</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Filière habituelle, selon Précautions Standard (pas de vaisselle jetable)
<i>Déchets</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Filière habituelle (déchets urbains), selon Précautions Standard
<i>Sanitaires</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Si pas de WC privé dans la chambre, installer une chaise percée dédiée au chevet ou dédier un WC commun à l'usage du résident
<i>Circulation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Le résident doit rester en chambre jusqu'à la fin de son isolement
<i>Voisin de chambre</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Les résidents peuvent continuer à partager la chambre si un isolement géographique avec le maintien d'une distance > 2 mètres entre eux est possible • Si voisin vacciné et asymptomatique = pas de quarantaine • Si voisin vacciné et symptomatique = isolement + test • Si voisin non-vacciné = quarantaine + test en cas de symptômes
<i>Visiteurs</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Les visiteurs doivent revêtir le même équipement de protection que le personnel et se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de la chambre • Chaque visiteur doit être informé des mesures à respecter par un collaborateur soignant avant la 1^{ère} visite

NETTOYAGE/DESINFECTION

<i>Environnement</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage-désinfection des surfaces/objets fréquemment touchés par le résident (table, table de chevet, poignées de porte, accoudoir, télécommande ...) et des WC 1x/jour avec le produit détergent-désinfectant habituel • Utiliser un simple détergent ou savon noir pour le sol • Nettoyage-désinfection <u>terminal</u> (toutes les surfaces, changement de draps, linge de bain, rideau) de la chambre et des WC à la levée de l'isolement
<i>Linge et vêtements</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C (selon PS) • Nettoyage des vêtements du résident à minimum 40°C (selon PS) • Changer la literie et le linge de bain à la levée de l'isolement
<i>Matériel de soins</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage-désinfection du matériel de soins avec le produit usuel avant de le sortir de la chambre

DECLARATION OBLIGATOIRE

Médecin cantonal	<ul style="list-style-type: none"> • Oui mais par le laboratoire, pas par l'EMS
Infirmière PCI	<ul style="list-style-type: none"> • Oui, merci d'informer l'infirmière PCI via scsp.pci@ne.ch