

objectif zéro rougeole

dans le canton de Neuchâtel

Situation épidémiologique

Entre 2000 et 2019, 97 cas de rougeole ont été notifiés dans le canton. La courbe épidémiologique évolue en vagues successives (Figure 1).

Après une période tourmentée entre 2007 et 2011, la rougeole n'a quasiment plus été détectée dans le canton entre 2012 et 2015. La campagne d'élimination de la rougeole menée au niveau cantonal a probablement eu un impact positif.

Depuis 2017, le nombre de cas de rougeole est de nouveau à la hausse, avec un pic provisoire de 14 cas en 2019 (Figure 1).

Une analyse par classe d'âge entre 2013 et 2019 montre que la rougeole touche non seulement les enfants d'âge préscolaire et scolaire, mais aussi les adolescent-e-s et les jeunes adultes (Figure 2). La rougeole se diffuse rapidement au sein de familles et dans des écoles où la protection vaccinale est insuffisante.

Couverture vaccinale

Selon la dernière enquête de 2017, la couverture vaccinale est optimale chez les adolescent-e-s de 16 ans (Figure 3). L'objectif de l'OMS de 95% est atteint !


En revanche, avec 88%, la couverture vaccinale des enfants de 2 ans est encore 7 points en-deçà du seuil. Ici, l'important est de ne pas oublier la seconde injection.

Un objectif à portée de main

Les chiffres de couverture vaccinale sont très prometteurs, le Service de la santé publique vous encourage à poursuivre votre action.


Ceci passe par le respect du calendrier vaccinal, le contrôle systématique du statut vaccinal et la vaccination de rattrapage à tout âge.

Figure 1 Nombre de cas déclarés de rougeole Canton de Neuchâtel ; 2000 – 2019 ; n=97




Source: SCSP

Figure 2 Répartition des cas de rougeole par classe d'âge ; Canton de Neuchâtel ; 2013 - 2019



Source: SCSP

Figure 3 Couverture vaccinale contre la rougeole chez les jeunes de 2, 8 et 16 ans ; Canton de Neuchâtel ; ECV 2017



Source: SCSP

Pour plus d'informations
www.ne.ch/rougeole
www.ne.ch/vaccination
www.ne.ch/cv

