




Mesures de prévention contre la bronchiolite




IMMUNISATION DU BÉBÉ OU VACCINATION DE LA MÈRE (32^e À 36^e SEMAINE DE GROSSESSE POUR UNE NAISSANCE ENTRE OCTOBRE 2025 ET MARS 2026)




BÉBÉ <3 MOIS : VISITES LIMITÉES À LA FAMILLE EN BONNE SANTÉ



HYGIÈNE DES MAINS AVANT ET APRÈS MANIPULATION DU BÉBÉ



DISTANCIATION PHYSIQUE DE LA FRATRIE EN CAS DE SYMPTÔMES DURANT LA PHASE AIGUE DE L'INFECTION



PORT DU MASQUE EN CAS DE SYMPTÔMES D'INFECTION RESPIRATOIRE



ÉVITER LES REGROUPEMENTS ET LES LIEUX TRÈS FRÉQUENTÉS (MARCHÉS, TRANSPORTS ETC) OU LES DIFFÉRER SELON L'AFFLUENCE

Sachez reconnaître la bronchiolite

Gêne ou sifflement respiratoire dans un contexte de toux, fièvre ou obstruction du nez.

En cas de symptômes :

Contactez en priorité le pédiatre de l'enfant

À défaut, appeler la Hotline pédiatrique au 0848 134 134

En cas d'urgence vitale, composer le 144

SI LE COMPORTEMENT DE VOTRE BÉBÉ CHANGE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE, ENFANT MOU, PRISES ALIMENTAIRES INFÉRIEURES À LA MOITIÉ DES RATIONS HABITUELLES SUR 3 REPAS CONSÉCUTIFS, RESPIRATION TRÈS RAPIDE OU TRÈS LENTE OU IRRÉGULIÈRE, COLORATION BLEUTÉE DES LÈVRES OU DES EXTRÉMITÉS, SE DIRIGER VERS LES URGENCES LES PLUS PROCHES.

Plus d'info sur www.ne.ch/bronchiolite

Service cantonal
de la santé publique

**ne.ch**
REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL