

DCI : ACIDE TRANEXAMIQUE**FORME GALÉNIQUE**

Ampoules 500mg / 5ml

ACTE MÉDICAL DÉLÉGUÉ CONCERNÉ

- **Etat de choc traumatique (pas de délégation ambulancière)**

INDICATION

Hémorragie traumatique non contrôlable de moins de 3 heures. (pas de délégation ambulancière)
Hémorragie du post-partum (pas de délégation ambulancière)

POSOLOGIE SELON AMD COMUP

- $\geq 60\text{kg}$ = 1g en IVL (10min)
- $< 60\text{kg}$ = 15mg/kg IVL (sur 10min)

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité à l'acide tranexamique ou à un autre composant du médicament.

Hypercoagulabilité manifeste, des caillots déjà formés étant susceptibles d'être stabilisés de façon indésirable par l'inhibition médicamenteuse de la fibrinolyse.

CIVD (syndrome de défibrination; confirmation du diagnostic par des tests de coagulation, voir également les recommandations décrites sous «Mises en garde et précautions»).

Hémorragie sous-arachnoïdienne.

Antécédents de convulsion

Insuffisance rénale grave

EFFET

Le Cyclokapron empêche la dégradation de la fibrine (celle-ci étant une protéine essentielle à la coagulation)

EFFETS INDÉSIRABLES OU SECONDAIRES

Troubles gastro-intestinaux (nausées, vomissements, diarrhées) Céphalées, vertiges, risque d'AVC ischémique et d'embolie pulmonaire

SURDOSAGE

Nausées, vertiges, céphalées, baisse de la tension artérielle et troubles orthostatiques.

RÉFÉRENCE

- Fiche pharmacologique CORFA 2015
- Compendium suisse des médicaments