

DCI : MIDAZOLAM**FORME GALÉNIQUE**

IV : Ampoule 5mg/5ml

ACTES MÉDICAUX DÉLÉGUÉS CONCERNÉS

- Troubles de la conscience : lors de crises convulsives récidivantes ou persistantes
- Antalgie traumatique : en combinaison avec la Kétamine

INDICATIONS

Crise convulsive

Sédatif lors d'administration de Kétamine

Induction et maintien de l'anesthésie (pas de délégation ambulancière)

Sédation de longue durée (pas de délégation ambulancière)

Etat d'agitation aigü en complément à l'Haldol (pas de délégation ambulancière)

POSOLOGIES SELON AMD COMUP

- Trouble de la conscience : 1mg IV / IN / IM Maximum 2mg
- Antalgie traumatique 0.01-0.02 mg /kg IV Maximum 2mg

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité aux benzodiazépines ou à un des excipients,

INCOMPATIBILITE : Bicarbonate de Sodium

EFFETS

Comme toutes les benzodiazépines, agit sur le système GABA comme agoniste des récepteurs. A des actions anxiolytiques, hypnotiques, myorelaxantes, anticonvulsivantes et amnésiante. Renforce les dépresseurs du SNC comme l'alcool

Délai d'action:2 min; Pic d'action 10-30 min; durée effet sédatif résiduel 2-4h

EFFETS INDÉSIRABLES OU SECONDAIRES

Risque accru chez les patients >60 ans atteints d'insuffisances respiratoires ou cardiaques

Diminuer la dose en cas d'insuffisance hépatique, cardiaque et chez la personne âgée

Dépression cardiorespiratoire: apnée, arrêt respiratoire et/ou cardiaque, surtout si injection trop rapide

Hypotension. Bronchospasme, laryngospasme. Nausées / vomissements

Réactions paradoxales : agitation, convulsions tonico-cloniques

Effet amnésiant, dépendance, confusion mentale

SURDOSAGE

Effets cités sous effets indésirables sont possibles.

Antidote: Flumazénil (Anexate); Attention toutefois si prise concomitantes d'antidépresseurs tricycliques, risque de convulsion lors d'administration de Flumazénil

RÉFÉRENCES

Fiche pharmacologique CORFA 2015, Compendium suisse des médicaments, AMLS, 2013, Manuel des urgences préhospitalières, Fiche pharmacologique HNE

Toutes reproductions interdites