

DCI : NALOXONE**FORME GALÉNIQUE**

IV : Ampoule 0,4mg / 1ml

ACTES MÉDICAUX DÉLÉGUÉS CONCERNÉS

- Troubles de la conscience dans un contexte d'intoxication aux opiacés, myosis, FR \leq 8/minute
- Antalgie non traumatique et traumatique en cas de détresse respiratoire FR \leq 8/minute après administration d'opiacés
- SCA en cas de détresse respiratoire FR \leq 8/minute après administration d'opiacés

INDICATION

Antagoniste pour les opioïdes

POSOLOGIES SELON AMD COMUP ET PREPARATION

Pour l'administration IV, diluer une ampoule (0.4mg/ml) avec 3 ml de NaCl 0.9% afin d'obtenir une dilution de 0,1mg/ml

- Trouble de la conscience : 0,4 mg IM puis 0,1mg IV jusqu'à FR $>$ 8 /minutes Max. 1mg
- Surdosage lors d'AMD Antalgie : 0,4 mg IN ou IM, à répéter une fois après 2 min si nécessaire

CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité à la Naloxone

EFFETS

La Naloxone est un antagoniste pur des récepteurs opioïdes. Il déplace les molécules opioïdes des récepteurs aux opiacés réduisant les effets de la dose des opiacés.

Le délai d'action est très rapide (1-2 minutes IVD, 3 minutes en IM ou SC).

La demi - vie de certains opiacés (p.ex. méthadone - 24h à 36h, héroïne 60 à 120 min) dépasse celle de la Naloxone (durée d'action par voie I.V. est de 20 à 30 minutes environ, par voie I.M. ou S.C., elle est de 2H30 à 3H). Par conséquent, une dépression du SNC est possible dans un deuxième temps.

EFFETS INDÉSIRABLES OU SECONDAIRES

Prudence si affection cardiaque préexistante

En cas de dépendance aux opioïdes, un syndrome de sevrage peut être provoqué, sudations, vertiges, légère obnubilation, tremblements, nausées, vomissements, hypertension

SURDOSAGE

La marge thérapeutique de la Naloxone est très grande. Aucun cas de symptômes d'intoxication n'a été observé jusqu'à présent.

RÉFÉRENCES

- Fiche pharmacologique CORFA 2015
- AMLS, 2013
- Fiche pharmacologique HNe
- Compendium suisse des médicaments
- Manuel des urgences préhospitalières

Toutes reproductions interdites