

Vaccination contre la grippe, le COVID-19, le VRS et les pneumocoques – pour qui et quand ?

Tableau 1. Groupes cibles recommandés pour les vaccins ou l'immunisation (aperçu simplifié)

Groupe cible (catégorie de recommandation)	Grippe (Influenza)	COVID-19	VRS	Pneumocoques
Voir aussi : www.bag.admin.ch/...	...influenza-fr	...covid-19-fr	...vrs	...maladies-a-pneumocoques
Adultes âgés (vaccination complémentaire)	À partir de 65 ans	À partir de 65 ans	À partir de 75 ans (actuellement non prise en charge par l'AOS)	À partir de 65 ans
Nouveau-nés en bonne santé et/ou Nourrissons en bonne santé (immunisation passive ou vaccination de base)	–	–	Anticorps monoclonaux pour les nouveau-nés et les nourrissons jusqu'à 12 mois pour la première saison de VRS après la naissance	Nourrissons à partir de 2 mois Vaccination de rattrapage jusqu'à la veille du 5 ^e anniversaire (< 59 mois), schéma de vaccination en fonction de l'âge
Enfants présentant des facteurs de risque (vaccination ou immunisation des groupes à risque)	À partir de 6 mois selon le plan de vaccination : Prématurés pour les deux premiers hivers après leur naissance	À partir de 16 ans selon le plan de vaccination : Degrés de sévérité définis de l'immunodéficience (y c. néoplasies, transplantations) ; maladies pulmonaires, cardio-vasculaires, rénales et hépatiques, diabète, IMC ≥ 35, trisomie 21	Anticorps monoclonaux jusqu'à 24 mois pour les prématurés et en cas de maladies préexistantes selon le plan de vaccination pour les deux premiers hivers après la naissance	À partir de 2 mois selon le plan de vaccination : Prématurés (immunisation de base)
Adultes présentant des facteurs de risque ou certaines maladies préexistantes susceptibles de provoquer une forme grave ou des complications (vaccination des groupes à risque)	Personnes avec maladie préexistante : Immunodéficience (y c. néoplasies, transplantations), maladies pulmonaires, cardio-vasculaires, neurologiques, musculo-squelettiques, hématologiques, rénales et hépatiques, asplénie, troubles fonctionnels de la rate, troubles métaboliques, IMC ≥ 40 Personnes en EMS et établissements de soins		À partir de 65 ans ou de 18 ans (en cas de risque très élevé) selon les recommandations de vaccination : Degrés de sévérité définis de l'immunodéficience (y c. néoplasies, transplantations, VIH), maladies pulmonaires, cardio-vasculaires, neurologiques, neuromusculaires, rénales, hématologiques, diabète, fragilité, personnes en EMS et établissements de soins (actuellement non prise en charge par l'AOS)	Personnes avec maladie préexistante : Degrés de sévérité définis d'immunodéficience (y c. néoplasies, transplantations, VIH), maladies pulmonaires, cardio-vasculaires, rénales (y c. syndrome néphrotique) et hépatiques, diabète, asplénie (y c. drépanocytose), implant cochléaire, fracture ou malformation de la base du crâne ; fistule de liquide céphalo-rachidien et maladie coeliaque chez les adultes
Femmes enceintes (vaccination des groupes à risque pour la protection de la femme enceinte ou vaccination maternelle à titre d'immunisation passive du nouveau-né)	Toute la durée de la grossesse et femmes ayant accouché au cours des quatre dernières semaines : pour protéger les femmes enceintes et indirectement les nouveau-nés	Avec maladie préexistante* protection des femmes enceintes Sans maladie préexistante , si le médecin juge le vaccin médicalement indiqué après évaluation du rapport bénéfice-risque	Femmes enceintes à partir de 18 ans, entre les SG 32+0 et 36+0 vaccination maternelle (à titre d'immunisation passive du nouveau-né)	–
Contacts de personnes à risque et Indication professionnelle	En cas de contact régulier avec les groupes de personnes mentionnés ci-dessus, des nourrissons ou des oiseaux sauvages ou de la volaille	–	–	–

* Maladies cardiovasculaires chroniques, maladies respiratoires chroniques, maladies rénales chroniques, maladies hépatiques chroniques, diabète sucré, obésité, maladies neurologiques et maladies affaiblissant le système immunitaire.

Des informations concernant la prise en charge des vaccinations et des vaccins par l'assurance obligatoire des soins (assurance de base) sont disponibles sur la page de l'OFSP « Prise en charge des coûts des vaccinations prophylactiques » : www.bag.admin.ch/fr/vaccinations-prophylactiques



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP

**Une
protection
en tout
temps.**

Tableau 2. Périodes et schémas de vaccination/immunisation recommandés

Groupe cible (catégorie de recommandation)	Grippe (influenza)	COVID-19	VRS	Pneumocoques
Voir aussi : www.bag.admin.ch/...	...influenza-fr	...covid-19-fr	...vrs	...maladies-a-pneumocoques
Adultes âgés Adultes présentant des facteurs de risque selon le tableau 1	À partir de 65 ans ou en présence de facteurs de risque Chaque année : 1 dose entre la mi-octobre et le début de la vague de grippe Vaccins : Efluelda® (à partir de 65 ans), Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip® À partir de 75 ans, ou de 65 ans avec facteurs de risque supplémentaires, privilégier un vaccin à haute dose.	À partir de 65 ans ou en présence de facteurs de risque Chaque année : 1 dose en automne (à partir de septembre) Vaccins : Comirnaty®, Spikevax®	À partir de 65 ans ou en présence de facteurs de risque 1 dose idéalement entre octobre et novembre , mais au plus tard avant le début de la vague de VRS Vaccins : Abrysvo®, Arexvy®, mResvia® (actuellement pas de prise en charge par l'AMO)	À partir de 65 ans : 1 dose Vaccins : Capvaxive®, Prevenar® 20 De 18 à 64 ans présentant des facteurs de risque : 1 dose Vaccin : Capvaxive®
Nouveau-nés en bonne santé et/ou Nourrissons en bonne santé	–	–	Nouveau-nés nés entre octobre et mars : 1 dose d'anticorps* au cours de la première semaine de vie ou dès que possible après Nourrissons nés entre avril et septembre : 1 dose d'anticorps en octobre ou dès que possible après Anticorps monoclonaux : nirsévimab (Beyfortus®), clesrovimab (Enflonsia®)	3 doses à l'âge de 2, 4 et 12 mois Vaccins : Prevenar® 13, Vaxneuvance® Vaccination de rattrapage jusqu'à la veille du 5 ^e anniversaire (< 59 mois), schémas de vaccination: voir ci-dessous
Enfants présentant des facteurs de risque selon le tableau 1	Prématurés à partir de 6 mois pour les deux premiers hivers après la naissance et enfants présentant des facteurs de risque : Chaque année : 1 dose entre la mi-octobre et le début de la vague de grippe Vaccins : Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	–	Prématurés et, en cas de maladies préexistantes , jusqu'à 24 mois : 1 dose d'anticorps également avant le deuxième semestre d'hiver, en octobre ou dès que possible après Anticorps monoclonal : nirsévimab (Beyfortus®)	Prématurés et nourrissons présentant des maladies préexistantes < 7 mois : 4 doses Schémas de vaccination de rattrapage, selon l'âge au moment de la première dose : - De 7 à 11 mois : 3 doses - De 12 à 23 mois : 2 doses - À partir de 24 mois : 1 dose Vaccins selon l'âge : De 2 à 59 mois : Prevenar® 13, Vaxneuvance® De 5 à 17 ans (6–17 ans hors étiquette) : Prevenar® 20, Vaxneuvance®
Femmes enceintes	Pendant toute la durée de la grossesse et femmes ayant accouché au cours des quatre dernières semaines : 1 dose entre mi-octobre et le début de la vague de grippe Vaccins : Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	Pendant toute la durée de la grossesse, de préférence au 2 ^e ou 3 ^e trimestre : 1 dose Vaccins : Comirnaty®, Spikevax®	1 dose* de vaccin maternel entre les SG 32+0 et 36+0 si le terme se situe entre début octobre et fin mars Vaccin : Abrysvo®	–
Contacts de personnes à risque et Indication professionnelle	Chaque année : 1 dose entre la mi-octobre et le début de la vague de grippe Vaccins : Efluelda® (à partir de 65 ans), Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®	–	–	–

* Les femmes enceintes doivent décider en connaissance de cause si elles préfèrent protéger leur nouveau-né (immunisation passive) en se faisant vacciner pendant la grossesse ou en le faisant immuniser par administration d'anticorps monoclonaux après la naissance.